

LBS.03 Actualité péri-opératoire

Recovery

L'étude **RECOVERY** démontre que le remplacement valvulaire aortique chirurgical précoce pour la sténose aortique sévère asymptomatique réduit significativement la mortalité à long terme par rapport à la gestion conservatrice.

Ablation Trial

L'étude **ABLATION** montre que l'ablation bi-atriale est supérieure à l'ablation auriculaire gauche seule pour le contrôle du rythme de la fibrillation auriculaire lors de la chirurgie valvulaire mitrale rhumatismale, sans risque accru de pacemaker.

Favor-IV QVAS

L'étude **FAVOR IV QVAS** a montré que le pontage aorto-coronarien guidé par FFR angiographique réduit la morbidité postopératoire chez les patients subissant une chirurgie valvulaire avec sténose coronaire, comparé à la méthode angiographique seule.

Top Trial

L'étude **TOP** a comparé les transfusions libérales v. restrictives chez patients à haut risque cardiaque post-chirurgie. Pas de différence sur le critère principal, mais la stratégie libérale a réduit l'insuffisance cardiaque et les arythmies.

From:
<https://clementbecle.fr/> - cb_cardio



Permanent link:
<https://clementbecle.fr/doku.php?id=lbs.03>

Last update: **2025/11/09 19:25**